




# Gynäkologisches Datenblatt Hund



Zusammengestellt durch Tierarzt Bruno Lötscher, Brienz

## 1. Läufigkeit

bei Erreichen des Erwachsenengewichtes  
kleine Rassen: ab ½ jährig  
grosse Rassen: erst ab 1jährig

### Zuchtreife:

Kein Hund sollte vor dem Alter von 1 Jahr zur Zucht verwendet werden

### Zyklus:

Je nach Rasse erfolgt die Läufigkeit alle 6 Monate (kleine Hunde) bis 12 Monate (grosse Hunde)

### Läufigkeit:

Vorbrunst ca. 1 Woche, Hündin blutet! Rüden werden abgewiesen  
Brunsdauer ca. 8 Tage  
Deckbereitschaft der Hündin

Zu einem definitiven Ende des Sexualzyklus im Alter kommt es nicht

### Eisprung:

Der Eisprung (Ovulation) beginnt am ca. 2. Bis 4.Tag der Brunst und dauert ca. 24 h.  
Während dieser Zeit erfolgt die Besamung

### Trächtigkeitsdiagnose:

Fruchtkammern in der 3. - 4.Woche tastbar

## 2. Kastration

Bei Familienhunden vor der 1. Läufigkeit empfohlen, da dadurch das Brustkrebsrisiko auf 1/7 absinkt. Keine Nachteile bei Frühkastration.

Blinden- und Schutzhunde erst nach der 1. Läufigkeit kastrieren.

Die Lernfähigkeit kann etwas besser sein.

Nicht während der Läufigkeit kastrieren: Blutungsgefahr!

### Nachteile:

Harninkontinenz (siehe Merkblatt)  
ev. Gewichtszunahme durch verbesserte Futterverwertung  
Fellveränderung: Achtung bei langhaarigen Hunden mit glänzendem Deckhaar  
Haarausfall: in seltenen Fällen Haarausfall in den Flanken

## 3. Verhinderung der Läufigkeit

Verabreichung von Schwangerschaftshormonen (Progestagenen) alle 5 Monate unterdrückt die Läufigkeit

Frühestens 3 Monate nach Läufigkeit beginnen und spätestens 1 Monat vor der nächsten.

Nicht vor dem 60. Tag nach dem Werfen behandeln

In seltenen Fällen kann es zu lebensbedrohender Gebärmuttervereiterung kommen

Bestes Medikament ist Proligeston:

Brustkrebsrisiko

Gebärmuttervereiterung

